



Anafilaktik Şok geçiren bir hasta sırt üstü yatırılarak bacakları yüksek pozisyona getirilir. Solunum yolu kontrol edilir ve hemen ambulans çağrılır. Anafilaktik Şok tedavisinde ADRENALİN çok önemli bir ilaçtır. Önemli düzeyde alerjileri olan hastaların mutlaka yanlarında adrenalin enjeksiyonu taşıması gerekmektedir. Sağlık ekipleri gelene kadar vakit kaybetmeden kol veya bacakların üst kısmına kas içeri-sine adrenalin enjeksiyonu yapılır.



BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48
Bahçelievler / ANKARA

☎ 0 312 203 05 00 - 5208


☎ 0 312 203 05 45 (Fax)



BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
İMMÜNOLOJİ ve ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

ANAFİLAKSİ

Anafilaktik Şok



ANAFİLAKSİ

anafilaktik şok

Anafilaksi, alerjik nedenlere bağlı olarak aniden gelişen ve hızlı bir seyirle ölüme yola açabilen bir reaksiyondur. Anafilaksi riskini arttıran en önemli faktör; önceden duyarlı olunan alerjenle karşılaşmak ve/veya geçmişte anafilaksi öyküsü bulunmaktır.

Birden fazla organ ve sistemi etkileyen bu tehlikeli reaksiyon önceden kestirilemez ve “ANAFİLAKTİK ŞOK” olarak adlandırılan ağır bir dolaşım bozukluğuna yol açar !

Başlıca

Belirtileri

- Ürtiker (kurdeşen), anjioödem, kaşıntı
- Burun akıntısı, gözlerde yaşarma
- Boğazda tıkanıklık hissi, nefes darlığı
- Karın ağrısı, bulantı-kusma, diare
- Kalpte ritim bozukluğu
- Göğüste sıkışma hissi
- Tansiyon düşüklüğü
- Baş dönmesi, bilinç kaybı
- Anksiyete, huzursuzluk

NEDENLERİ

Besinler Ve Katkı Maddeleri

- Süt
- Yumurta
- Kabuklu deniz ürünleri (ıstakoz, midye v.s)
- Soya fasulyesi
- Kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz, kaju v.s)
- Tropikal meyveler (kivi, ananas, avokado v.s)
- Buğday
- Tohumlar
- Sülfatlar ve diğer tüm katkı maddeleri.

İlaçlar

- Antibiyotikler: penisilin, penisilin türevleri ve diğer antibiyotikler
- Kan sulandırıcılar
- Kortizon içermeyen ağrı kesiciler
- Bağışıklık sağlayan ilaçlar: aşılar, antitoksinler (arı, yılan, akrep serumları), kan ürünleri, İmmünglobulinler.

Radyolojide Kullanılan Maddeler

- Radyo-kontrast maddeler

Böcek Isırmaları

- Arı
- Akrep
- Örümcek

Diğer Nedenler

- Yılan ısırması
- Lateks (doğal kauçuk=lastik) içeren maddelere maruz kalma (eldiven, giysi v.s).

TANI

Hastalığın belirtileri ve fizik muayene bulguları ile tanı koyulur. Hastada yukarıda sıralanan belirtilerin birçoğu mevcuttur. Kanda yapılan bazı testler tanı için kullanışlı değildir.

