

« Lateks  
alerjisinin hafif  
belirtilerinde  
tedavi olarak  
antihistaminikler  
ve kortizon içeren  
ilaçlar kullanılırken  
ağır vakalarda ya  
da acil durumlarda  
adrenalin kullanılması  
gerekir. »



**BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**  
İMMÜNOLOJİ ve ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

# LATEKS

## Alerjisi



**BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**  
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48  
Bahçelievler / ANKARA

☎ 0 312 203 05 00 - 5208

☎ 0 312 203 05 45 (Fax)

## LATEKS

### Alerjisi

**Lateks**, kauçuk ağacının süt-lü özütünden elde edilir. Bu maddeden yapılmış olan ürünlere karşı gelişen alerjik reaksiyonlara “**lateks alerjisi**” denir.

Lateksten yapılan başlıca ürünler; lastik ayakkabı, araba-bisiklet tekerleği, dalgıç giysisi, balon, emzik, biberon, oyuncak, bulaşık eldiveni, kon-dom, tıbbi-cerrahi malzemeler (muhtelif tüpler, şırıngalar, maskeler, sondalar v.s.)

Lateks alerjisinde belirtiler bağışıklık yanıtına bağlı olarak ortaya çıkar. Temasa bağlı tahriş (iritasyon) neticesinde gelişen belirtiler gerçek alerji değildir.

### başlıca

#### belirtileri

- Kaşıntı -
- Kızarıklık -
- Kurdeşen -
- Hapşırma -
- Burun akıntısı -
- Gözlerde kaşıntı ve sulanma
- Boğazda gıcık hissi -
- Öksürük -
- Nefes darlığı -
- Anafilaksi -

Belirtiler lateks içeren ürüne temas ettikten sonra (eldivenin giyilmesi) veya havada asılı parçacıkları soluduktan sonra (eldivenin çıkarılması) ortaya çıkar. Belirtilerin şiddeti maruz kalınan lateks miktarına ve bireysel hassasiyete bağlıdır.

Bu belirtilerin görüldüğü hastalıklar; kurdeşen, alerjik rinit, astım ve anafilaksidir.



### TANI

Hastalığın belirtileri, fizik muayene bulguları, deri testleri (delme, yama) ve kanda latekse özgü antikor tayini ile tanı koyulur.

### RİSK ALTINDA OLANLAR

Lateksli ürünlerin sık kullanılmasına bağlı olarak; sağlık çalışanları, spina bifida veya idrar yolu anormallikleri ile doğan çocuklar, birden fazla ameliyat geçiren yada tıbbi işleme maruz kalanlar, kauçuk sanayisinde çalışanlar, alerji öyküsü olanlarda alerji gelişme riski yüksektir!

### LATEKS-MEYVE SENDROMU

Lateks ile bazı meyveler (avokado, muz, kestane, kivi, şeftali) arasında yapısal benzerlik bulunmaktadır. O nedenle lateks alerjisi olanlarda bu meyvelerin yenmesi ağız, dil ve dudaklarda kaşıntı, şişlik ve ses kısıklığı ile karakterize bir hastalık tablosu geliştirir. Buna lateks-meyve sendromu denir.

### KORUNMA

Lateks içeren ürünlerden uzak durulmalı. Çapraz reaksiyon veren meyveler yenmemelidir!

**Önceden lateks alerjisine bağlı şiddetli reaksiyon geçirmiş olan hastalara acil durumlarda kullanmaları için adrenalin otoenjektörü reçete edilmelidir!...**